

Overige diensten

- **Vrijwel alle voorkomende operaties**
 - OCD
 - Cornage operaties
 - Castatie hengst (half-bedeekt, gesloten (over de lies)
 - Castratie klophengst
 - Navelbreuk
 - Etc..
- **Kreupelheidsonderzoeken incl**
 - Diagnostische anaesthesieën
 - Echografie van pezen en gewrichten
 - Röntgen
 - Therapie
- **Röntgenologisch onderzoek**
 - Ook op locatie / aan huis
 - Aan- en verkoop
 - PROK
 - KWPN
 - Screening
 - Kreupelheid
- **Luchtweg onderzoek**
 - Bronchoscopie
 - BAL (cellen diepere luchtwegen)
- **Begeleiding fokmerries, incl diepvries KI**



Adres: Steenovenstraat 23
4706 RA Roosendaal

Paardenpraktijk West-Brabant:


Tel: 0165-559368
Fax: 0165-394720
info@paardenpraktijk.nl
www.paardenpraktijk.nl

eDigit Mobiel paardenonderzoek:

Tel: 076-5031377 / 06-53457452
Fax: 076-5031375
info@edigit.nl
www.edigit.nl



OCD, gevolgen en therapie



O.C.D. fragment in sprongewricht


Informatie folder voor eigenaren van paarden met Osteochondrosis Dissecans (OCD).

Osteochondrosis Dissecans

OCD is een afkorting van het latijnse woord osteochondrosis dissecans. OCD betekent letterlijk loskomen van stukjes been en kraakbeen van het originele bot.

OCD komt uitsluitend voor in gewrichten. Voornamelijk in het spronggewricht, het kniegewricht en de kogelgewrichten.

De letsels worden gevormd doordat er een stoornis optreedt in de normale ontwikkeling van het bot tijdens de groei. De normale verbening van kraakbeen is verstoord, waardoor er stukken kraakbeen en/of bot op bepaalde plaatsen in een gewricht loskomen. OCD ontstaat dus tijdens de groei tot de leeftijd van minimaal 9 maanden afhankelijk van de locatie. Vanaf een leeftijd van 12 maanden kunnen paarden röntgenologisch worden gecontroleerd op OCD.



De gevolgen van OCD voor een gewricht variëren van ernstige artrose tot weinig schade. De schade

is afhankelijk van de locatie en grootte van een fragment, het type arbeid dat het paard moet verrichten en de intensiteit waarmee deze verricht wordt.

Het eerste signaal van OCD bij jonge paarden is meestal een overvulling van het betreffende gewricht. Dit kan op korte of langere termijn gevolgd worden door kreupelheid.

In veel gevallen is een jong paard dus (nog) niet kreupel van de OCD.



Een OCD fragmentje kan echter op langere termijn de sportcarrière van een paard wel aardig in de weg zitten. Het is daarom van belang dat er tijdig wordt ingegrepen om de toekomst van uw paard veilig te stellen. Eenmaal ontstane schade herstelt nooit meer volledig na het verwijderen van het fragment!

De operatie wordt uitgevoerd door **Carmen Scheffer**, Europees Specialist Chirurgie (ECVS). De paarden worden de dag voor de operatie op de kliniek verwacht en mogen 2 dagen na de operatie weer naar huis.



Nazorg als uw paard is geopereerd aan OCD

Het geopereerde gewricht is in een verband gezet (sprong 3 dagen, kogel 2 weken), het kniegewricht wordt niet ingepakt.

Het paard moet na de operatie het behandelde been goed blijven belasten en het been mag niet overmatig zwellen.

Een gewricht wat voor de operatie ernstig overvuld was zal dit na de operatie nog steeds zijn.

Tien dagen na de operatie kunnen de hechtingen worden verwijderd.

Het paard moet gemiddeld 3 weken boxrust hebben en vervolgens 3 weken aan de hand worden gestapt.

Van bovenstaande richtlijnen kan op advies van de dierenarts worden afgeweken. U krijgt na de operatie een operatieverslag mee.

Paardenpraktijk West-Brabant

eDigit Mوبiel Paardenonderzoek